

Le rouge (*Rhizosphaera kalkhoffii*)

Cette maladie est présente sur plusieurs plants en aménagement paysager. Le champignon affecte les aiguilles au printemps. Il provoque le rougissement, suivi du brunissement et la chute prématurée des aiguilles. Il ne faut pas confondre cette maladie avec la dessiccation hivernale qui a causé beaucoup de dégâts cet hiver.

Plantes affectées

Picea sp. plus fréquemment, *Picea pungens* et les cultivars

Éléments de diagnostic

- Jaunissement, puis rougissement des aiguilles au début de l'automne de la 2^e année se poursuivant au printemps suivant;
- Au cours de la 2^e année, au printemps, les aiguilles prennent une teinte violacée;
- Chute des aiguilles. Il peut y avoir une défoliation localisée sur les branches affectées;
- Les branches inférieures sont souvent affectées en premier, de l'intérieur de l'arbre vers l'extérieur;
- Dans certains cas, seules les aiguilles de la pousse de l'année persistent dans l'arbre.

Lutte préventive

- Tailler les branches mortes et trop sévèrement affectées près du tronc lorsque le temps est sec. Désinfecter le sécateur entre chaque coupe avec de l'alcool à friction 70 %;
- Installer un paillis à la base des arbres et utiliser un système d'arrosage goutte-à-goutte ou un boyau perforé pour réduire les éclaboussures de pluie ou d'eau d'arrosage sur le feuillage;
- Éviter les stress comme le manque d'eau en période de sécheresse et une trop faible fertilité;
- Ramasser et détruire les vieilles aiguilles au pied de l'arbre;
- Éviter les plantations trop denses.